

Dicebrol[®] 75 mg

CINARIZINA 75 mg

VASODILATADOR CENTRAL Y PERIFÉRICO

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Cinarizina.....	75 mg
Excipientes	c.s.p.

INDICACIONES

Síndrome vertiginoso: vértigos, mareos, acúfenos, marcha insegura. Vértigos de origen cervicoartrosico: Síndrome de Barré-Liéou, vértigos posturales y funcionales.

Vértigos de origen central y periférico. Profilaxis de cefaleas vasculares. Prevención del mareo cinético.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Antagonista de la entrada de iones Ca a través de la membrana de la célula muscular lisa, que se traduce por una acción anti vasoconstrictora de las fibras musculares lisas de vasos cerebrales y periféricos.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

En general para los trastornos a que están indicados se recomienda una posología media de 2 a 3 comprimidos diarios dividida en dos o tres tomas. En las afecciones crónicas, el tratamiento debe hacerse ininterrumpidamente por varias semanas. Esta dosis puede ser modificada según criterio médico.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedad de Parkinson o sintomatología extrapiramidal, fase aguda de ictus cerebral.

Hipersensibilidad a la Cinarizina o a cualquier componente de la formulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Glaucoma e hipertrofia prostática. Si aparecen síntomas extrapiramidales suspender la administración del medicamento.

La cinarizina puede causar somnolencia, por lo que deberán tener precaución las personas que deban conducir vehículos o manejen maquinaria peligrosa.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Somnolencia, molestias digestivas, fatiga, reacciones cutáneas y efectos anticolinérgicos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Potencia sedación de depresores del SNC.

Potencia efecto y/o toxicidad de anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos.

SOBREDOSIS (Singos, Síntomas y Tratamiento)

La sobredosis de Cinarizina reportados con mayor frecuencia incluye: Alteraciones de la conciencia que van desde la somnolencia al estupor y coma, vómitos, síntomas extrapiramidales e hipotonía. En un pequeño número de niños pequeños, se desarrollaron convulsiones.

En caso de intoxicación o sobredosis, acudir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, o llamar al Teléfono: (021) 204 800/204 908 o al 911. Asunción.

RESTRICCIONES DE USO

No ha sido establecida seguridad.

Se ignora si este medicamento es excretado en cantidades significativas con la leche materna, y si ello pudiese afectar al niño. Se recomienda suspender la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 comprimidos.

**Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15°C y 30°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en su envase original hasta su utilización.**

**DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN
NUESTRO COMPROMISO**

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA

La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por

Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063,

Ciudad de Ypané. Departamento Central.

Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 06312-05-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA**