

Jarabe

Vía Oral

Algyn Balsámico N.F.

HEDERA HELIX 35 mg / 5 mL

EXPECTORANTE - MUCOLÍTICO

COMPOSICIÓN

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Hedera helix.....	35 mg
(Extracto seco de hojas de hiedra 10%)	
Excipientes.....	c.s.p.

INDICACIONES

Algyn Balsámico N.F. es un medicamento fitoterápico el cual contiene extracto de Hedera helix, utilizado como expectorante y mucolítico para la tos productiva en adultos.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Aún no se ha aclarado del todo el mecanismo de acción de Hedera helix. Sin embargo, se ha postulado que la actividad de la hoja de hiedra está ligada a la presencia de saponinas. Estos compuestos actuarían ejerciendo una acción irritante local de la mucosa gástrica, que conduciría al aumento reflejo de las secreciones bronquiales, diluyendo así el mucus y reduciendo su viscosidad. La expulsión de los esputos estaría favorecida por la acción fluidificante de las saponinas. Esta acción se basa en una disminución de la tensión superficial de las mucosidades. Este efecto, específicamente mucolítico y de dilución de las secreciones, se muestra particularmente importante en el caso de una bronquitis obstructiva, ya que favorece la eliminación de las sustancias extrañas.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO

Dosis:

Según prescripción médica. Adultos y niños mayores de 12 años: 5 mL de jarabe cada 8 horas. La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico; el tratamiento debe durar como mínimo una semana aún en el caso de inflamaciones menores del tracto respiratorio. El tratamiento debe mantenerse durante 2 – 3 días una vez que los síntomas han disminuido, con el fin de asegurar el éxito duradero del tratamiento. No debe administrarse por más de 15 días consecutivos, a menos que el médico así lo indique.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este medicamento no debe ser usado por más de 15 días. Si los síntomas no ceden, el paciente debe consultar al médico. No se recomienda el uso concomitante con antitusígeno como la Codeína. Se recomienda usar con precaución en pacientes con gastritis o úlcera gástrica. Los pacientes deben ser instruidos en buscar consejo médico, si llegan a presentar disnea, fiebre o esputo purulento mientras se encuentran en tratamiento con Hedera Helix.

Este medicamento contiene Sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarosa-isomaltosa, no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene Metilparabeno y Propilparabeno

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Frecuentes: Se han notificado reacciones del sistema gastrointestinal (náuseas, vómitos o diarrea).

Poco frecuentes: Se han notificado reacciones alérgicas (urticaria, erupciones cutáneas, cuperosis, disnea).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de la formulación.

No se han realizado estudios de interacciones. No se han comunicado interacciones con otros medicamentos ni otras formas de interacción.

SOBRESOSIS (Signos, Síntomas y Tratamiento)

En caso de intoxicación o sobredosis, acudir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, o llamar al Teléfono: (021) 204800/204908 o al 911. Asunción.

RESTRICCIONES DE USO

No se ha establecido la seguridad de administrar durante el embarazo y/o lactancia.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco x 120 mL. + vaso dosificador.

Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN NUESTRO COMPROMISO.
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.

La consulta médica regular, es uno de los pilares de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063, Ciudad de Ypané.

Departamento Central. Paraguay.

Teléfono: 021 614 313 R.A.

Dir. Téc. Qca. Fca. Teresa Tanaka / Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 20503-02-FH

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA**