

Broncogen®

TEOFILINA - CLORFENIRAMINA - ÉTER GLICERIL GUAYACOL EXPECTORANTE - BRONCODILATADOR - ANTIALÉRGICO

COMPOSICIÓN

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Teofilina Anhidra	50 mg
Clorfeniramina Maleato	2 mg
Eter Gliceril Guayacol	100 mg
Excipientes	c.s.p.

INDICACIONES

Está indicado en la profilaxis y tratamiento de todos aquellos cuadros con broncoespasmos, asma bronquial, bronquitis espasmódicas, alergia estacional, disnea asmática.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Teofilina: Relaja el músculo liso bronquial y los vasos pulmonares por acción directa sobre los mismos, aumenta el aclaramiento mucociliar. Otras acciones: Vasodilatación coronaria, diuresis, estimulante cerebral, cardíaco y del músculo esquelético.

Clorfeniramina: Antagonista de los receptores H de histamina.

Éter Gliceril Guayacol: Se cree que ejerce su acción farmacológica a través de la estimulación de los receptores en la mucosa gástrica.

Esta acción incrementa la secreción de las glándulas del sistema gastrointestinal y a su vez de forma refleja incrementa el flujo de fluidos de las glándulas que revisten el aparato respiratorio. El resultado es un incremento en el volumen de las secreciones bronquiales y un descenso de su viscosidad.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL cada 6 a 8 horas.

Niños de 6 a 12 años: 5 mL cada 6 a 8 horas.

Niños menores de 6 años: Según prescripción médica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier componente de la formulación.

Hipersensibilidad a las xantinas, taquiarritmia aguda.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Utilizar con precaución ajustando individualmente la dosis en presencia de angina de pecho inestable, propensión a taquiarritmia, hipertensión severa, cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, hipertiroidismo, epilepsia, úlcera gástrica y/o duodenal, porfiria. Importante monitorizar al paciente en caso de ancianos, personas con múltiples patologías, pacientes gravemente enfermos y/o pacientes en cuidados intensivos, en obesos ajustar posología según peso, emplear dosis inferiores en pacientes > 65 años y en fumadores. Precaución en pacientes con tratamiento previo con otros medicamentos que contengan Teofilina. Evitar ingerir grandes cantidades de té, café, cacao, cola, chocolate. La fiebre disminuye el aclaramiento de Teofilina, puede ser necesario disminuir la dosis para evitar una intoxicación. Utilizar con precaución en caso de padecer Diabetes mellitus.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Taquicardia, arritmia, palpitaciones, hipotensión, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad del tono muscular en el esfínter esofágico inferior, hipocalcemia, aumento del Ca sérico, hiperglucemia e hiperuricemia, cambios en electrolitos séricos, dolor de cabeza, agitación, temblor, nerviosismo, insomnio, aumento de diuresis y de creatinina sérica. Ligera somnolencia, mareo y debilidad muscular, sequedad de nariz y garganta.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Teofilina: Disminuye la acción de litio.

Acción antagonizada por: β -bloqueantes.

Acción y riesgo de efectos adversos aumentados por: Diuréticos (furosemida), halotano.

Acción/toxicidad aumentada por: Digitálicos, anticonceptivos orales, antibióticos macrólidos, quinolonas, imipenem, isoniazida, tiabendazol, antagonistas del Ca, propranolol, mexiletina, propafenona, ticlopidina, cimetidina, ranitidina, alopurinol, febuxostat, fluvoxamina, interferón alfa, peginterferón alfa-2, zafirlukast, vacunas antigripales, etintindina, idrocilamida, zileuton. Acción disminuida por: Barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, fosfenitoína, rifampicina, rifapentina, sulfpirazona, productos que contengan hipérico.

Revierde efecto sedante de benzodiacepinas. Interfiere con determinaciones de ác. úrico, catecolaminas urinarias y ác. grasos libres en plasma. Determinaciones de Teofilina por métodos espectrofotométricos pueden ser alterados por: Fenilbutazona, furosemda, probenecid.

Interacciones debidas a la Clorfeniramina: Alcohol o medicamentos que producen depresión sobre el sistema nervioso central. Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), incluyendo furazolidona (antibacteriano) y procarbazona (anticanceroso): Su uso simultáneo puede intensificar los efectos anticolinérgicos y depresores del sistema nervioso central de los antihistamínicos.

Antidepresivos tricíclicos o maprotilina pueden potenciar los efectos anticolinérgicos de estos medicamentos o de los antihistamínicos como Clorfenamina.

SOBREDOSIS (Signos, Síntomas y Tratamiento)

En caso de intoxicación o sobredosis acudir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos o llamar al teléfono (021) 204 800/204 908 o al 911. Asunción.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo, lactancia, niños menores de 6 meses.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco x 100 mL.

Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN
NUESTRO COMPROMISO.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.

La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por

Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063,

Ciudad de Ypané. Departamento Central.

Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 08018-04-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA**