

# Xilan®

## ALFA AMILASA

### ANTIINFLAMATORIO ENZIMÁTICO

#### COMPOSICIÓN

##### Xilan grageas

Cada gragea contiene  
Alfa Amilasa.....3.000 U. CEIP  
(Equiv. a 54 mg)  
Excipientes.....c.s.p.

##### Xilan Solución

Cada 5 mL de solución contiene  
Alfa Amilasa.....1.000 U. CEIP  
(Equiv. a 18 mg)  
Excipientes..... c.s.p.

#### INDICACIONES

Tratamiento y prevención de todos los procesos inflamatorios de tipo edematoso de origen: infeccioso, post quirúrgico, post traumático, indeterminado.  
Medicina General: Anginas, traqueitis, bronquitis, neumopatías agudas y crónicas, procesos catarrales gripales, etc.

Cirugía: Cirugía general, maxilofacial, traumatológica, ginecológica, otorrinolaringológica, plástica y reparadora.

Ginecología y Obstetricia: Síndrome inflamatorio pelviano, mastitis, anexitis, episiotomías.

O.R.L.: Otitis, sinusitis, anginas, faringitis, laringitis, traqueitis, pre y post operatorio en amigdalectomía y adenoidectomía.

Traumatología y ortopedia: Contusiones, edemas bajo yeso, distensiones, traumas articulares, fracturas, hematomas, roturas de ligamentos.

Odontología: Extracciones dentales, gingivitis, parodontitis y cualquier proceso inflamatorio localizado en la boca.

#### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Antiinflamatorio enzimático. Su acción controla el proceso inflamatorio de cualquier origen, reabsorbe el edema y la extravasación celular con restitución integral al cabo de unas horas. La absorción de enzimas y otras sustancias macromoleculares del tracto gastrointestinal al torrente circulatorio o los vasos linfáticos en forma cualitativa y científicamente comprobados. Una vez absorbidas las enzimas se unen a antiproteasas alfa -1 y alfa-2 macroglobulina, con lo que el sistema inmune del paciente reconozca como antígenos, sin que estos signifiquen que se inhibe la actividad enzimática.

#### POSOLÓGIA Y MODO DE USO

##### Solución Oral

Lactantes y niños de 6 meses a 3 años (7 kg a 15 kg): 5 mL de solución cada 8 horas.

Niños a partir de 3 años de edad (> 15 kg): 10 mL de solución cada 8 horas.

Adultos: 15 mL de solución cada 8 horas.

##### Grageas

La dosis usual para adultos es de 1 gragea 4 veces al día. Esta dosis puede ser modificada por el Médico, según criterio y la gravedad del caso.

#### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la Alfa Amilasa o a algún otro componentes de la formulación.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La Alfa Amilasa ofrece un amplio margen de seguridad, pero deberá usarse con precaución en pacientes con trastornos del mecanismo de la coagulación (hemofilia), y en presencia de hepatopatías y nefropatías graves.

Se recomienda tener cuidado en pacientes con conocida hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o en pacientes con tratamiento anticoagulante, debido a que se espera una actividad fibrinolítica del preparado enzimático. Se debe tener precaución con la ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento, ya que el alcohol puede disminuir la actividad de las enzimas proteolíticas como la alfa amilasa.

Uso en embarazo y lactancia: Hasta la fecha no se han demostrado efectos teratogénicos ni embriotóxicos de la Alfa Amilasa. Como medicamento, su uso durante el embarazo y la lactancia queda bajo responsabilidad del médico tratante

Xilan solución puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene Metilparabeno y Propilparabeno.

Xilan solución contiene Propilenglicol puede producir síntomas parecidos a los del alcohol, por lo que puede disminuir la capacidad para conducir o manejar maquinarias.

Xilan solución contiene Sorbitol, si su médico le ha indicado que padece de intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar/ usar este medicamento.

Xilan grageas contiene azúcar, si su médico le ha indicado que padece de intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar/ usar este medicamento

#### REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

El uso de Alfa Amilasa a altas dosis ha provocado, en muy raras ocasiones, urticaria e hinchazón en el rostro y el cuello con molestias respiratorias (edema de Quincke), sensación de plenitud abdominal, meteorismo y casos aislados de náuseas.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Entre los medicamentos que pueden aumentar los niveles de Amilasa se encuentran la aspirina, asparaginasa, agentes colinérgicos, corticoesteroides, diuréticos tiazídicos,

metildopa, codeína, morfina, anticonceptivos orales y pentazocina. El uso concomitante de la Alfa Amilasa con antibióticos ha demostrado un aumento de la concentración del antibiótico en el sitio de la infección. Por otro lado, no se han descrito observaciones clínicas de interacción de este producto con otros medicamentos que justifiquen la exploración a nivel experimental. Sin embargo, en los pacientes bajo terapia con anticoagulantes (warfarina, heparina, ácido acetil salicílico, acenocumarol, ticlopidina y dipiridamol), la seguridad del uso de la Alfa Amilasa debe estar bien justificada. El alcohol disminuye la actividad del fármaco.

#### **SOBREDOSIS (Signos, Síntomas y Tratamiento)**

Los síntomas de sobredosis con Alfa Amilasa corresponden a una intensificación de los efectos adversos, tales como: Náuseas, vómitos, dolor estomacal, así como taquicardia y dificultad para respirar. Se recomienda tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación o sobredosis acudir al Hospital mas cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, o llamar al Teléf.: (021) 204-800 / 204 908 o al 911. Asunción.

#### **RESTRICCIONES DE USO**

Embarazo - Lactancia.

Pacientes con antecedentes de insuficiencia hepática y renal, pacientes con trastornos de coagulación.

#### **PRESENTACIONES**

Xilan Grageas

Caja conteniendo 12 grageas.

Caja conteniendo 24 grageas.

Xilan Solución

Caja conteniendo 1 frasco x 125 mL

**Mantener en lugar fresco a temperatura entre (15°C a 30°C).**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Conservar en su envase original hasta su total utilización.**

**DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN  
NUESTRO COMPROMISO.**

**CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.**

La consulta médica regular, es uno de los pilares  
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063,

Ciudad de Ypané. Departamento Central.

Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka / Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Xilan Grageas Reg. Sanit. N°: 21572-02-EF

Xilan solución Reg. Sanit. N°: 21770-01-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

[farmacovigilancia@siegfried.com.py](mailto:farmacovigilancia@siegfried.com.py)

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



**SIEGFRIED**

**VENTA BAJO RECETA  
INDUSTRIA PARAGUAYA**