

Comprimidos

Vía Oral

Uterine[®]

ISOXSUPRINA HCl 10 mg

ÚTERORRELAJANTE

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Clorhidrato de Isoxsuprina.....10 mg

Excipientes..... c.s.p.

INDICACIONES

Amenaza de aborto. Trabajo de parto prematuro. Distocia por alteración de la contractilidad. Insuficiencia vascular periférica (claudicación intermitente, síndrome de Raynaud, acrocianosis, entumecimiento de las extremidades, síndrome de congelación, dolor y calambres, pesantez de los miembros, sensación de hormigueo, palidez y vasculopatías incipientes del diabético). Insuficiencia cerebrovascular (cefaleas, lagunas mentales, mareos, vértigos, fatiga mental y física, cambios del carácter, ataques isquémicos, confusión asociada a aterosclerosis, diabetes e HTA, parestesias, trastornos del sueño, irritabilidad y desorientación).

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Produce vasodilatación periférica mediante un efecto directo sobre el músculo liso vascular, principalmente en el músculo esquelético, con un pequeño efecto sobre el flujo sanguíneo cutáneo. Se pensó que sus efectos se debían a la estimulación de receptores beta-adrenérgicos, pero no revertían por bloqueantes beta-adrenérgicos. La Isoxsuprina produce estimulación cardíaca y relajación uterina; disminuye la resistencia vascular periférica y aumenta la frecuencia y el gasto cardíaco.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Deberá administrarse con las comidas, con leche o con antiácidos para reducir la irritación gastrointestinal.

Posología: Adultos: Por vía oral, de 10 a 20 mg cada 6 a 8 horas.

CONTRAINDICACIONES

Antes de la semana 20 de gestación; hemorragia ante parto que obligue a interrumpir el embarazo; eclampsia; preeclampsia; óbito; corioamnionitis; cardiopatía; hipertensión pulmonar; hipertiroidismo; diabetes mellitus descontrolada; hipovolemia; arritmias cardíacas asociadas con taquicardia o intoxicación digitalica; HTA descontrolada; feocromocitoma; asma bronquial bajo tratamiento con beta miméticos y/o esteroides; hipersensibilidad conocida a la droga; hemorragia aguda o reciente; hipotensión severa; hemorragia vascular cerebral reciente; infarto al miocardio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Embarazo: Atraviesa la placenta y puede producir taquicardia en el R.N. Se debe administrar de decúbito lateral, y controlar la presión uterina, frecuencia cardíaca fetal. La administración IV puede aumentar la incidencia de hipoglucemia, hipocalcemia íleo e hipotensión en el neonato.

Geriatría: Puede aumentar el riesgo de hipotermia.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Raras: Arritmias, angina, rash. Muy raramente edema agudo pulmonar.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Nicotina: El uso abundante y simultáneo de fumar tabaco puede interferir con los efectos terapéuticos de la isoxsuprina debido a que la nicotina contrae los vasos sanguíneos.

Bloqueadores beta-adrenérgicos: Pueden antagonizar el efecto de la isoxsuprina.

SOBREDOSIS (Signos, Síntomas y tratamiento)

En caso de intoxicación o sobredosis, acudir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, o llamar al Teléfono: (021) 204800/204908 o al 911. Asunción.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo - Lactancia.

No administrar en presencia de hemorragia

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 Comprimidos.

Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN NUESTRO COMPROMISO.
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.

La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063, Ciudad de Ypané.

Departamento Central. Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N° 12088-04-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA