

Suspensión

Vía Oral

Clovir® Forte

ACICLOVIR 400 mg / 5 mL

ANTIVIRAL

COMPOSICIÓN

Cada 5 mL contiene:

Aciclovir.....	400 mg
Excipientes.....	c.s.p.

INDICACIONES

Esta indicado en infecciones de la piel y membranas mucosas, producidas por el virus del herpes simple, infecciones mucocutáneas, infecciones por herpes simple (tipo I y II) de la piel y mucosas incluyendo el herpes genital inicial y recurrente. Profilaxis en pacientes inmunodeprimidos y no inmunodeprimidos.

Tratamiento de las infecciones por herpes Zóster y varicela Zóster. Eficaz en la reducción de la extensión de la erupción y en la disminución de la intensidad del prurito y sintomatología en general.

POSOLOGÍA

La primera dosis debe ser administrada tan pronto como sea posible una vez desarrollada la infección. En el caso de infecciones recurrentes será conveniente comenzar el tratamiento al primer síntoma o signo.

Dosis usual en Varicela Zóster en niños mayores de 2 años 20 mg/Kg/dosis: 4 veces al día durante 5 días. No exceder los 800 mg/dosis.

Para niños menores de 2 años: Se debe utilizar la mitad de esta dosis. En las demás patologías las dosis varían según la condición específica del paciente, por lo que debe administrarse según criterio médico.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco.

Pacientes con alteraciones de la función renal, preexistente, hepática o anomalías neurológicas.

EFFECTOS COLATERALES

Es generalmente bien tolerado, excepcionalmente y en pacientes se ha informado efectos secundarios, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea y dolor abdominal. Rara vez rash cutáneo que desaparecen al suspender la droga.

Otros efectos en forma aislada, aumento de la bilirrubina plasmática, pequeños aumentos de la urea y creatinina sanguíneas. Cefaleas, reacciones neurológicas reversibles y fatiga.

INTERACCIONES

La administración simultánea con ACICLOVIR intravenoso aumenta la vida medio promedio y el área bajo la curva de concentración-tiempo. Esta combinación reduce la excreción urinaria y depuración renal. Los efectos clínicos de esta combinación no han sido estudiados.

ACICLOVIR no debe administrarse de manera concomitante con sangre, soluciones que contengan proteínas o parabenos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se administrará con precaución en pacientes con deshidratación, disfunción renal o disfunción neurológicas preexistentes, porque puede agravar estos procedimientos. No se recomienda su empleo durante el embarazo a menos que

los posibles beneficios para la madre justifiquen los riesgos potenciales para el feto y en pacientes de edad avanzada porque pueden sufrir disfunción renal o deshidratación.

SOBREDOSIS (Signos, Síntomas y Tratamiento)

Entre los efectos clínicos de la sobredosis están signos de nefrotoxicidad, incluyendo valores elevados de creatinina en suero y de BUN. Después de dosis altas no se ha informado sobre toxicidad aguda. En caso de sobredosificación acudir al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas, sito en Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: (021) 204-800. Asunción.

RESTRICCIONES DE USOS

Anomalías neurológicas.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco x 120 mL.

Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN
NUESTRO COMPROMISO

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA

La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por

Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063,

Ciudad de Ypané. Departamento Central.

Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1663

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 21514-02-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA**